

Sterol(s) fermentative transformation - using polyoxyethylated sterol cpds. as emulsifying agents

Patent Number : **DE 3147843**

International patents classification : C07J-005/00 C12P-033/00

• **Abstract :**

DE3147843 A Use of ethoxylated sterols as emulsifiers in fermentative transformations of sterols is new.

Suitable microorganisms include strains of Achromobacter, Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Microbacterium, Mycobacterium, Nocardia, Protaminobacter, Serratia and Streptomyces. Particularly suitable are the mutant strains described in EP Application 79101036, namely CBS 437,77, ATCC 31456, ATCC 31457, ATCC 31459, ATCC 31460, DSM 1437, DSM 1439, DSM 1442, DSM 1443, DSM 1444 and DSM 1445.

Ethoxylated sterols exert an emulsifier action and at the same time enhance the metabolism of sterol-degrading microorganisms, so that sterol metabolic products (e.g. 1,4-pregnadien-3-one 20-carboxylic acid BNC) are produced in increased yields.

• **Publication data :**

Patent Family : DE3147843 A 19830707 DW1983-28 9p •

Priority n° : 1981DE-3147843 19811203

Covered countries : 1

Publications count : 1

• **Patentee & Inventor(s) :**

Patent assignee : (HENK) HENKEL KGAA

Inventor(s) : KERSTEN J; KRBECHER L; LEENDERS P;
SCHINDLER J

• **Accession codes :**

Accession N° : 1983-706107 [28]

Sec. Acc. n° CPI : C1983-064529

• **Derwent codes :**

Manual code : CPI: B01-B03 B01-D02

B12-M09 D05-C04

Derwent Classes : B01 D16

• **Update codes :**

Basic update code :1983-28

BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3147843 A1**

⑤① Int. Cl. 3:
C07 J 5/00
C 12 P 33/00

②① Aktenzeichen: P 31 47 843.3
②② Anmeldetag: 3. 12. 81
②③ Offenlegungstag: 7. 7. 83

Benördeneigentum

DE 3147843 A1

⑦① Anmelder:
Henkel KGaA, 4000 Düsseldorf, DE

⑦② Erfinder:
Krbachek, Leroy, Dr., 55427 Golden Valley, Mn., US;
Leenders, Peter, 55436 Edina, Mn., US; Kersten,
Jerry, 55337 Burnsville, Mn., US; Schindler, Joachim,
Dr., 4010 Hilden, DE

⑥④ »Mikrobielle Sterinfermentation«

Die Verwendung von ethoxylierten Sterinen als Emulgatoren in der mikrobiellen Sterinfermentation führt zu einer Erhöhung der Ausbeute an Stoffwechselprodukten. Insbesondere bei Einsatz einer Kombination von ethoxylierten Sterinen und anderen Emulgatoren metabolisieren die zum sterinabbaubefähigten Bakterien in erhöhtem Maße. (31 47 843)

DE 3147843 A1

3147843

NACHGERICHT

Patentanmeldung D 6434

- 8 -

HENKEL KGaA
ZR-FE/Patente

P a t e n t a n s p r u c h

Verwendung von ethoxylierten Sterinen als Emulgatoren in
der fermentativen Sterintransformation.

...

Düsseldorf, 27.11.1981
Henkelstraße 67

HENKEL KGaA
ZR-Patente
Ba/Ne

P a t e n t a n m e l d u n g

D 6434

"Mikrobielle Sterinfermentation"

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Sterinfermentation, bei welchem ethoxylierte Sterine als Emulgatoren eingesetzt werden.

- Es besteht ein wachsender Bedarf an Steroidzwischenstufen für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe. Dieser
- 10 Bedarf wird zunehmend aus fermentativ gewonnenen Abbauprodukten von Sterinen gedeckt. Dazu werden Sterine pflanzlichen oder tierischen Ursprungs in reiner oder stark angereicherter Form in wässriger Nährlösung eingesetzt. Durch Zusatz von Emulgatoren wird für eine
- 15 geeignete Verteilung der Sterine in dem wässrigen Nährmedium gesorgt. Diese Emulgatoren dürfen das Wachstum der Microorganismen und den Sterinabbau nicht stören. In der DE-OS 29 36 125 ist ein Verfahren zum fermentativen Sterinabbau beschrieben, bei dem als Ausgangsmaterial
- 20 ein natürlich angereichertes Sterinkonzentrat dient. Als Emulgatoren werden Polyhydroxymethylmonolauryläther eingesetzt. Die Sterinkonzentrate werden zu 20-1,4-Pregnen-3-on (BNC) abgebaut. In der älteren deutschen Patentanmeldung P 31 13 035 ist ein Verfahren zur Herstellung
- 25 eines trizyklischen Steroidabbauproduktes unter Verwendung der Microorganismen-Defektmutante Chol 149-K 14 (DSM 2065) beschrieben. Als Emulgatoren wurden Fett-

...

säure-sorbitanester oder Ethylenoxidaddukte, Polyoxy-
ethylen, Monolauryläther oder Fettsäureamidoalkylbetain
verwendet. In der Europäischen Patentanmeldung 79 101 036
ist ein Verfahren zur Herstellung von 3-Oxo-pregna-4-en-
5 20-carbonsäure (Δ -4 BNC) und/oder 3-Oxo-pregna-1,4-dien-
20-carbonsäure (Δ -1,4 BNC) aus Steroids substraten mit
längeren Substituenten in C-17-Stellung auf fermenta-
tiven Wege beschrieben. Als Emulgatoren wurden Tween 80
(Polyoxyäthylensorbitanmonooleat) und BRI J 35 (Poly-
10 oxyethylenmonolauryläther) verwendet.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß sterinabbauende
Mikroorganismen in Gegenwart von ethoxylierten Sterinen
als Emulgatoren in gesteigertem Maße metabolisieren und
dabei in erhöhten Mengen Stoffwechselprodukte, wie z. B.
15 BNC bilden. Ethoxylierte Sterine sind optimale Emul-
gatoren für den fermentativen Sterinabbau; sie führen zu
einer beachtlichen Ausbeutesteigerung an Abbauprodukten.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung
von ethoxylierten Sterinen als Emulgatoren in der mikro-
20 biellen Sterintransformation. Es sind pflanzliche und
tierische ethoxylierte Sterine mit verschiedenem Ethoxy-
lierungsgrad geeignet. Die erfindungsgemäße mikrobielle
Sterinfermentation erfolgt in grundsätzlich bekannter
Weise. So kann beispielsweise die als Einsatzmaterial
25 gewählte Steroidverbindung der Mikroorganismenkultur
während der Inkubationsperiode zugesetzt werden, oder
sie kann dem Nährmedium vor der Inokkulierung der Defekt-
mutante beigegeben werden.

Es kann eine Steroidverbindung oder eine Mischung aus
30 mehreren Steroidverbindungen eingesetzt werden.

Die optimale Konzentration an Steroidausgangsverbindung
ist durch einfache Vorversuche zu ermitteln.

Sie liegt im allgemeinen im Bereich von 0,1 bis 100 g pro Liter Nährmedium. Es kann dabei vorteilhaft sein, das dem partiellen Abbau zu unterwerfende Substrat nicht auf einmal dem Reaktionsmedium zuzusetzen, sondern dieses
5 portionsweise im Verlauf der Reaktion zuzugeben. Dabei kann die Zugabe im wesentlichen kontinuierlich erfolgen.

Die Mikroorganismenkultur wird in einem Nährmedium gezüchtet, das als Kohlenstoffquelle die zu transformierende Steroidverbindung und gegebenenfalls noch zusätzliche
10 metabolisierbare Kohlenstoffquellen, sowie die üblicherweise von diesen Mikroorganismen benötigten Nähr- und Wachstumsstoffe enthält. Geeignete Stickstoffquellen sind Ammoniumsalze, Nitrate, Maisquellwasser, Sojamehl, Schlempe oder Fischmehl. Auch Fermentationsbe-
15 schleuniger wie Hefeextrakt und Vitamine können zugesetzt werden. Das Nährmedium enthält darüber hinaus üblicherweise anorganische Salze wie Natrium-, Kalium- oder Ammonium-Phosphate oder Calcium-, Magnesium-, Mangan- und/oder Eisensalze. Die Emulgierung des Steroid-
20 ausgangsmaterials erfolgt mit den ethoxylierten Sterinen. Besonders vorteilhaft ist es, ethoxylierte Sterine in Kombination mit anderen Emulgatoren einzusetzen. Dadurch wurde eine weitere Steigerung der Bildung von Steroid-
abbauprodukten festgestellt. Insbesondere in Kombination
25 mit Kokosfettsäuremonoäthanolamid wurde ein deutlicher synergistischer Effekt, d. h. eine weitere Erhöhung der Produktivität der Mikroorganismen festgestellt. Geeignete Steroidausgangsmaterialien für die Transfor-
mation sind natürliche Sterine wie Cholesterin, Sito-
30 sterin, Stigmasterin und/oder Ergosterin oder Abkömmlinge hiervon.

...

- Auch Gallensäuren, wie Cholsäure, Desoxycholsäure, Lithocholsäure und deren Gemische oder weitere Verbindungen mit der Steroidgrundstruktur, z. B. partielle Abbauprodukte von natürlichen Sterinen, sind geeignet. Als
- 5 Microorganismen, die zur Sterinfermentation befähigt sind, seien beispielhaft genannt:
- Achromobacter, Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Microbacterium, Mycobacterium, Nocardia, Protaminobacter, Serratia und
- 10 Streptomyces.

- Besonders geeignet für die Steroidtransformation zu BNC sind die in der Europäischen Patentanmeldung 79 101 036 beschriebenen Mutantenstämme, die aus bestimmt ausgewählten Wildstämmen mit anschließender Mutation und
- 15 Selektion gewonnen worden sind. Es sind dies die Stämme: CBS 437,77, ATCC 31 456, ATCC 31457, ATCC 31459, ATCC 31460, DSM 1437, DSM 1439, DSM 1442, DSM 1443, DSM 1444 und DSM 1445.
- Im einzelnen gelten dabei die Angaben in der genannten
- 20 europäischen Anmeldung.

Beispiel 1

- Der Stamm T 191 (Corynebacterium spec.) DSM 1444 wurde in folgendem Nährmedium bei 30°C aerob angezüchtet: 0,30 % Glucose, 0,90 % Hefeextrakt, 0,80 % Pepton, 0,10 %
- 25 K₂HPO₄, 0,08 % NaH₂PO₄ (pH 7,0), 0,5 % Cholesterin und 0,3 % ethoxyliertes Sojasterin (Generol 122-Typen). In 4 Parallelansätzen wurde Sojasterin mit 5 Mol, 10 Mol, 16 Mol und 25 Mol Ethylenoxid geprüft. Nach einer Kulturdauer von 144 Stunden wurden Proben gezogen und die Aus-
- 30 beute an BNC per Dünnschichtchromatographie bestimmt:

Emulgator	BNC-Ausbeute (g/l)			
	$\Delta-1,4$	$\Delta-1,4,17$	$\Delta-4$	Σ
ohne	0,70	0,12	Spur	0,82
Generol 122-E5	0,93	0,28	0,06	1,27
" " E 10	0,80	0,21	0,08	1,09
5 " " E 16	0,71	0,20	0,05	0,96
" " E 25	0,89	0,10	0,03	1,02

Beispiel 2

In einer weiteren Versuchsserie wurde unter den gleichen Bedingungen wie in Beispiel 1 die Wirkung von ethoxylierten Verbindungen in Kombination mit einem weiteren Emulgator geprüft. Es wurden folgende Ergebnisse erhalten:

Versuchsbedingungen: wie Beispiel 1

Emulgator	BNC-Ausbeute (g/l)			
	$\Delta-1,4$	$\Delta-1,4,17$	$\Delta-4$	Σ
15 0,1 % Comperlan 100 ⁺				
0,2 % Generol 122-E 5	1,08	0,33	0,07	1,38
0,1 % Comperlan 100				
0,2 % Generol 122-E 10	0,81	0,32	0,15	1,28
0,1 % Comperlan 100				
20 0,2 % Generol 122-E 16	1,33	0,35	0,17	1,85
0,1 % Comperlan 100				
0,2 % Generol 122-E 25	1,43	0,40	0,18	2,01

+ Comperlan: Kokosfettsäuremonoethanolamid

Eine Steigerung der BMC-Bildung aus Sterinen durch ethoxylierte Generol 122-Typen konnte auch am Beispiel einer weiteren Bakterienart demonstriert werden.

Beispiel 3

- 5 Der Stamm SC 372-837 (*Corynebacterium equi*) DSM 1990 wurde in folgendem Medium bei 30°C aerob angezüchtet:

0,25 % Glucose, 0,25 % Laktat, 0,80 % Hefeextrakt, 0,70 % Pepton, 0,10 % K_2HPO_4 , 0,08 % NaH_2PO_4 , 0,50 % Cholesterin, 0,30 % ethoxylierte Sterine (pH 7,0).

- 10 Es wurden folgende Ergebnisse erhalten:

		BMC (g/l)			Σ
Emulgator		Δ -1,4	Δ -1,4,17	Δ - 4	
	ohne	1,98	0,24	0,16	2,38
	Generol 122-E 5	3,49	0,36	0,12	3,97
15	Generol 122-E 10	3,28	-	-	3,28
	Generol 122-E 16	3,50	0,29	0,13	3,92
	Generol 122-E 25	3,46	0,39	0,10	3,95

Beispiel 4

- 20 In einer weiteren Versuchsserie wurde unter den gleichen Bedingungen wie in Beispiel 3 die Wirkung der ethoxylierten Sterine in Kombination mit weiteren Emulgatoren geprüft. Es wurden dabei folgende Ergebnisse erhalten:

- 8 -

Emulgator	BNC (g/l)			Σ
	$\Delta-1,4$	$\Delta-1,4,17$	$\Delta-4$	
0,1 % Comperlan 100				
0,2 % Generol 122-E 5	4,21	0,55	0,13	4,91
5 0,1 % Comperlan 100				
0,2 % Generol 122-E 10	3,35	0,46	0,31	4,12

Der Stamm SC 372-837 (*Corynebacterium equi*) DSM 1990 wurde unter den gleichen Kulturbedingungen wie in Beispiel 3 jedoch unter Verwendung von 0,3 % Generol 122 anstelle von Cholesterin als Substrat angezüchtet.

Es wurden folgende Ergebnisse erhalten:

Emulgator	BNC (g/l)
ohne	0,48
0,3 % Generol 122-E 10	0,77
15 0,3 % Generol 122-E 16	0,81
0,3 % Generol 122-E 25	0,73

This Page Blank (uspto)

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**

This Page Blank (uspto)